


FASES DE LA ENFERMEDAD DEL ALCOHOLISMO

FASES PURAMENTE
SINTOMATICAS (SINTOMAS)

FASES ALCOHOLOMANAS SOBREPUESTAS A LA BEBIDA SINTOMATICA



FASES PREALCOHOLICA FASES PRODROMICA
(MALESTAR QUE PRECEDE
A UNA ENFERMEDAD)

FASES CRITICA

FASES CRONICA

I.- FASE PREALCOHOLICA

- Alivio ocasional de las tensiones por medio de la bebida.
- Alivio constante de las tensiones por medio de la bebida.
- Aumento de la tolerancia al alcohol.

II.- FASE PRODROMICA (Malestar que precede a una enfermedad)

- 1.- Palimpsestos o Amnesia Alcohólica.
- 2.- Beber subrepticamente "o a escondidas".
- 3.- Preocupación por el Alcohol.
- 4.- Beber con avidez.
- 5.- Sentimientos de culpa por la manera de beber.
- 6.- Evita hablar del Alcohol en sus conversaciones.
- 7.- Aumento en la frecuencia de los palimpsestos o lagunas mentales.

III.- FASE CRUCIAL O CRITICA

- 8.- La pérdida de control (Desenfreno, Agresividad).
- 9.- Racionalizaciones de la bebida.
- 10.- Trata de neutralizar las presiones sociales.

- 11.- Comportamiento grandioso y fanfarrón.
- 12.- Conducta marcadamente agresiva.
- 13.- Remordimientos persistentes.
- 14.- Periodo de abstinencia completa.
- 15.- Intentos de cambio en la manera de beber.
- 16.- Alejamiento de los amigos.
- 17.- Renuncia de los empleos.
- 18.- La bebida llega a ser el centro de sus actividades.
- 19.- Pérdida de los intereses externos.
- 20.- Cambio de la interpretación de las relaciones interpersonales.
- 21.- Compasión de si mismo (actitud de mártir).
- 22.- Escape Geográfico (esconderse, fugarse, perderse).
- 23.- Cambio de los hábitos familiares.
- 24.- Resentimientos irracionales.
- 25.- Protección de su abastecimiento de alcohol.
- 26.- Descuido de su propia nutrición.
- 27.- Primera hospitalización.
- 28.- Disminución del apetito sexual.

- 29.- Celotipia alcohólica (pasión de los celos).
- 30.- Beber en ayunas todos los días.

IV.- FASE CRONICA

- 31.- Intoxicaciones prolongadas (tandas).
- 32.- Marcado deterioro moral.
- 33.- Transtornos del pensamiento.
- 34.- Psicosis alcohólica (enfermedad mental).
- 35.- Beber sustancias que no son propiamente alcoholes.
- 36.- Beber con gente de nivel social muy inferior al propio.
- 37.- Disminución de la tolerancia al alcohol.
- 38.- Temores indefinidos.
- 39.- Temblores persistentes.
- 40.- Inhibición psicomotora (locura).
- 41.- El beber adquiere carácter obsesivo.
- 42.- Aparecen vagos impulsos religiosos.
- 43.- Todo el sistema de racionalización fracasa.
- 44.- Hospitalización definitiva.
- 45.- Pérdida de la vida.